


Aguililla Ala-ancha (*Buteo platypterus*)

Nombre en Inglés: Broad-winged Hawk

Promedio contado anual: 1,792,121

Distribución (Verano-Migración-Invierno)



Identificación:




Es un gavilán de talla mediana, el dorso café y el pecho barrado café con tonos negros y blancos e infracobertoras de las alas de color café en los adultos, las alas muy anchas con las plumas de tono claro con la punta negra que forman una banda en el contorno del ala (vista por debajo), la cola es mediana con dos bandas blancas, muy notorias cuando despliega la cola al estar planeando en una termal. Existen también individuos de fase oscura.

Medidas: 34-44 cm (13-17 in) **WS:** 81-100 cm (32-39 in)

Rango de reproducción: E. y Cent. Canadá y E. Estados Unidos

Área de invernación: S. México hasta el Amazonas

Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



Otra información:

Representa el ~38% de las rapaces contadas en Cardel y Chichicaxtle en el otoño.

Son muy buenas paleadoras y se agrupan en parvadas de miles de individuos, aunque no es raro verles solos o en parvadas de otras especies migrantes. Es un migrante completo. Su tiempo de migración es muy corto observándose mayores parvadas durante la última semana de septiembre, aunque se observa desde mediados de septiembre y hasta finales de octubre

Su dieta es variable, mamíferos pequeños, como roedores son sus presas regulares. Completa su dieta con anfibios, reptiles, insectos, otros invertebrados e incluso aves pequeñas.

Foto: Jerry Liguori


Ilustración: Julio Gallardo

Broad-winged Hawk (*Buteo platypterus*)

Local Name: Aguililla Ala-ancha

Average Number/ Year: 1,792,121

Range Map:



Identification:

**Broad-winged Hawk
(*Buteo platypterus*)**



Identification: Underside light with a black border on the trailing edge of the wings. Tail has black and white bands. Wings flat when soaring. Much smaller than Turkey Vulture or Swainson's Hawk. Immature has streaked breast and narrow brown tail banding. Rare dark morph has body and front half of wings dark.

L: 34-44 cm (13-17 in) **WS:** 81-100 cm (32-39 in)


Breeding Range: E. & Cent. Canada & E. United States

Winter Range: S. Mexico to Amazonia

Average Number/Year: 1,724,842

Local Name: Aguililla Ala-ancha

Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



Other Information:

Broad-winged Hawks comprise ~38% of the raptors counted at Cardel and Chichicaxtle.

The Broad-winged Hawk is a complete migrant. They vacate their breeding grounds completely in the winter. (There is an endemic Caribbean population that is sedentary.)

After feeding in South Texas, Broad-winged Hawks are not observed eating during their passage through Veracruz. It is widely believed that they fast during this part of migration.

Broad-winged Hawks winter in Southern Mexico, Central America and Amazonia.

Raptor Photo: Jerry Liguori

Raptor Drawing: Julio Gallardo