

# Aguililla Cuaresmeña (*Buteo swainsoni*)

Distribución (Verano-Migración-  
Invierno)



Nombre en Inglés: Swainson's Hawk  
Promedio contado anual: 811,572



## Identificación:



Una ave que grande que tiene las alas largas y ligeramente redondeadas, con la cola mediana, el dorso café oscuro con el pecho e infracobertoras de las alas blancas y babero (mancha en el cuello) de color café. Las régimes son oscuras y la cola finamente barrada pero oscura. También hay de fase oscura y rojiza.

**Medidas:** 48-56 cm (19-22 in) **WS:** 119-132 cm (47-52 in)


**Rango de reproducción:** Oeste de Canadá, US y el Norte de México

**Área de invernación:** Argentina

Foto: Jerry Liguori

Ilustración: Julio Gallardo

## Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



## Otra información:

Se observa desde los primeros días de octubre y la primera semana de noviembre de cada año, sin embargo, la segunda y tercera semana de octubre son las fechas con mayor número de esta especie en Veracruz.

Vuela casi siempre planeando en grandes grupos juntos con auras y alas anchas. Cuando aletea lo hace lentamente.


En su viaje a Sudamérica, recorren entre 10.000 a 12.000 km en aproximadamente dos meses. Migran sólo planeando utilizando las corrientes de aire y no se detienen para alimentarse, únicamente para descansar, con lo que evitan el aleteo que implica el gasto energético

Su dieta varía según la estación; en la temporada reproductiva se alimenta principalmente de mamíferos (conejos, perritos de la pradera y murciélagos, entre otros) mientras que en la temporada no reproductiva se alimenta principalmente de insectos (saltamontes, libélulas, langostas y escarabajos).

# Swainson's Hawk (*Buteo swainsoni*)


**Local Name:** Aguililla Cuaresmeña  
**Average Number/ Year:** 811,572

## Range Map:



## Identification:

### Swainson's Hawk (*Buteo swainsoni*)



Identification: Relatively long wings held up in a dihedral. Body and front half of wings light. Trailing half of wings dark. Dark bib on chest. Bib on immature incomplete, with streaking on body. Dark morph: body and front half of wings also dark.

**L:** 48-56 cm (19-22 in) **WS:** 119-132 cm (47-52 in)


**Breeding Range:** W. Canada, W. US & N. Mexico

**Winter Range:** Argentina

**Average Number/Year:** 731,260

**Local Name:** Aguililla Cuaresmeña

## Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



## Other Information:

Swainson's Hawks comprise ~17% of the raptors counted at Cardel and Chichicaxtle.

The Swainson's Hawk is a complete migrant. They vacate their breeding grounds completely in the winter.

After feeding in South Texas, Swainson's Hawks are not observed eating during their passage through Veracruz. It is widely believed that they fast during this part of migration.

Swainson's Hawks winter on the pampas of central Argentina. While on their breeding grounds, they eat a wide range of vertebrates and invertebrates, on their wintering grounds they feed almost exclusively on insects.

Raptor Photo: Jerry Liguori

Raptor Drawing: Julio Gallardo