


# Gavilán Pollero (*Accipiter cooperi*)

Nombre en Inglés: Cooper's Hawk  
Promedio contado anual: 2,310

Distribución: (Verano-**Todo el año**-**Invierno**)



## Identificación:



E

Es un gavilán de talla mediana (mayor que el estriado). Los adultos tienen el dorso gris oscuro, y las partes inferiores barradas de color naranja, ojo rojo a rojo naranja, los inmaduros son café y el pecho con estrias (gotas) de color café. La punta de la cola redondeada con una banda ancha de color blanco y la cabeza es muy prominente del nivel de los hombros.

**Medidas:** 39-50 cm (15-20 in) **WS:** 62-90 cm (24-35 in)


**Rango de reproducción:** Noroeste de México, Estados Unidos y Canadá

**Área de invernación:** Estados Unidos y México

Foto: Jerry Liguori

Ilustración: Julio Gallardo

## Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



## Otra información:

Son rápidos y buenos cazadores en lugares con vegetación densa. El aleteo es rápido y su vuelo es firme debido a su talla, acostumbran planear para ganar altura rápidamente. Es más frecuente observarlos en las montañas y cerca de la costa. Son migrantes solitario aunque suelen unirse con parvadas numerosas.


Es un migrante parcial, es decir no el total de la especie hace migraciones de larga distancias o completas. Se les observa en el centro de Veracruz desde el mes de septiembre hasta finales de noviembre, sin embargo el mayor número de Cooper's que pasa por el centro de Veracruz es entre mediados de octubre.

**Alimentación:** La dieta de estos gavilanes son de aves pequeñas como pollos, palomas, carpinteros entre otras aunque se les ha visto cazando mamíferos pequeños como ardillas y conejos.

# Cooper's Hawk (*Accipiter cooperi*)


**Local Name:** Gavilán Pollero  
**Average Number/ Year:** 2,310

## Range Map:



## Identification:


### Cooper's Hawk (*Accipiter cooperi*)



**Identification:** Short, broad, round-tipped wings and long, narrow tail. Alternates flapping and gliding. Separated from Sharp-shinned by slower wingbeats and proportionately longer tail with rounded tip. Straight leading edge of wing causes Cooper's head to appear proportionately larger than the Sharp-shinned's.

**L:**39-50 cm (15-20 in) **WS:** 62-90 cm (24-35 in)  
**Breeding Range:** N.W. Mex., continental US & S. Canada  
**Winter Range:** United States & Mexico  
**Average Number/Year:** 2,125  
**Local Name:** Gavilán Pollero

## Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



## Other Information:

The Cooper's Hawk migration coincides with that of the other migrant from *Accipiter* genus, the Sharp-shinned Hawk.

The Cooper's Hawk is a partial migrant. Some populations winter on their breeding grounds. In areas where Cooper's Hawk is observed year-round, more northern and western populations are more highly migratory.

At Cardel and Chichicaxtle, they are usually seen singly or in small groups mixed with large flocks of other migrating hawks.

Raptor Photo: Jerry Liguori  
Raptor Drawing: Julio Gallardo