


Gavilán Rastrero (*Circus cyaneus*)

Nombre en Inglés: NortherHarrier
Promedio contado anual: 306

Distribución (Verano-**Todo el año**-**Migración**-Invierno)



Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



Identificación:

Este milano es de talla mediana, tiene las alas largas y ligeramente redondeadas y la cola mediana, Los machos son grises con las puntas de las alas negras y las hembras e inmaduras cafés, estos últimos con el pecho liso de color canela. Todos los individuos poseen un parche blanco en la rabadilla que es muy notorio.

Medidas: 45-56 cm (18-22 in) **WS:** 100-117 cm (39-46 in)

Rango de reproducción: Casi en todo Canadá y los Estados Unidos.

Área de invernación: S. de Estados Unidos, México, Centro América and Colombia in S. América.

Otra información:

Vuela en las mañanas o en las tardes casi siempre solas y muy bajas, aunque también se integra en las parvadas de otras aves. Cuando planean las alas forman una V, se les ve balancearse de un lado a otro y baten las alas lenta y profundamente.

Son migrantes parciales y las que llegan a observarse por Veracruz son migrantes de larga distancia

Se observan durante toda la temporada migratoria pero a finales de octubre se concentran el mayor número de esta especie.

Caza buscando en el suelo con un vuelo de planeo rápido y bajo. Suele mantener las alas en forma de V, con lo que puede sorprender a aves pequeñas o incapacitadas, pequeños roedores e incluso insectos grandes. Habita en parajes abiertos como pantanos, praderas esteparias o dunas de arena.

Foto: Jerry Liguori

Northern Harrier (*Circus cyaneus*)

Local Name: Gavilán Rastrero
Average Number/ Year: 306

Range Map:



Identification:

Northern Harrier (*Circus cyaneus*)

Identification: Has long wings and tail. When soaring above, body appears narrow and tail very long. Is more likely to flap wings than other migrants.

L: 45-56 cm (18-22 in) **WS:** 100-117 cm (39-46 in)

Breeding Range: Most of Canada, N. United States


Winter Range: S. United States, Mexico, Central America and into Colombia in S. America.

Average Number/Year: 390

Local Name: Gavilán Rastrero

Raptor Photo: Jerry Liguori

Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



Other Information:

The Northern Harrier is a partial migrant. Some populations winter on their breeding grounds.

Some Northern Harriers are long-distance migrants.

Most observation of Northern Harriers is of their low-flying hunting style. In Cardel and Chichicaxtle, Harriers are seen soaring overhead singly or mixed in flocks of other migrants.