

# Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*)

Nombre en inglés: Swallow-tailed Kite  
Promedio contado anual: 293

Distribución (Vagabundo-Verano-  
Migración-Todo el año)



## Identificación:

Inconfundible. Largas y puntiagudas alas y una cola en forma de tijeras abiertas, el cuerpo es blanco, y las plumas de vuelo negras es decir las alas y la cola negras.


**Medidas:** 50-64 cm (20-25 in) **WS:** 117-135 cm (46-53 in)

**Rango de reproducción:** Este de los Estados Unidos

**Área de invernación:** Norte de América del Sur.

\*Datos de la especie que se reproduce en Norte América, ya que hay poblaciones reproductivas en América del sur.

## Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



## Otra información:

La migración de este Milano coincide con la del Milano de Misisipi, pero es el migrante más temprano de todas las rapaces en Cardel y Chichicaxtle

Es un migrante parcial, aunque, toda la población de Estados Unidos abandona sus sitios de reproducción, uniéndose a las poblaciones residentes de América del Sur.

Algunas poblaciones del Sureste de los Estados Unidos migran vía Islas del caribe, y algunos otras que pasan por Cardel y Chichicaxtle lo hacen por el Golfo de México.


Esta especie es monógama y solo pone en promedio 2 huevos por año. Se alimenta de insectos capturados en vuelo y además comen serpientes, ranas. Se sabe que toman agua como lo hacen las golondrinas.

Foto: William Clark

# Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*)

**Local Name:** Milano Tijereta  
**Average Number/ Year:** 293

## Range Map:



## Identification:

### Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*)

Identification: Unmistakable. Long pointed wings and deeply forked tail. Body white. Front half of wings to wrists white. Remainder of wings and tail dark.

**L:** 50-64 cm (20-25 in) **WS:** 117-135 cm (46-53 in)

**Breeding Range:** Primarily extreme SE United States.


**Winter Range:** N. half of South America

**Average Number/Year:** 150

**Local Name:** Milano Tijereta

Raptor Photo: William Clark

## Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



## Other Information:

The timing of migration of the Swallow-tailed Kites coincides roughly with the more numerous Mississippi Kites. It is the earliest migrant at Cardel and Chichicaxtle.

The Swallow-tailed Kite is a partial migrant. However, the U.S. population completely vacates its breeding range, joining resident populations in South America.

Some populations migrate via a Caribbean path. Others, including the individuals seen in Cardel and Chichicaxtle go around the gulf.