

Zopilote Común (Nopo) (*Coragyps atratus*)

Nombre en Inglés: Black Vulture
Promedio contado anual: No es reportado como migratorio en Veracruz.


Distribución (Vago-**Todo el año**)



Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:

No migratorio. Población residente todo el año.

Identification:



Es una ave grande totalmente negra con alas anchas que tiene un parche blanco en las remiges primarias, la cola es muy corta, tiene la cabeza desnuda y negra, que cuando vuelan se les ve por debajo del nivel del cuerpo.

Medidas: 60-68 cm (24-27 in) **WS:** 137-150 cm (54-59 in)

Distribución anual: Disperso en el E.deEstados Unidos y México, Centroy Sur América.

Otra información:

Cada año se puede observar en el cielo Veracruzano esta rapaz que no es migratoria, pero si comparten el espacio con las rapaces que migran cada otoño.

Este zopilote no es migratorio de Veracruz, pero muy a menudo se le ve volando o en corrientes termales junto con otras especies de aves que si son migratorias y se juntan en las corrientes termales donde los zopilotes se remontan, también suele verse dentro de líneas de Zopilotes Aura y otras migrantes, pero sus números no son anotados para evitar anotar aves residentes por migrantes.

Son carroñeros así que se alimentan de cualquier animal que se encuentren en el campo o carretera muertos.

Foto: Bill Clark
Ilustración: Julio Gallardo

Black Vulture (*Coragyps atratus*)

Local Name: Zopilote (Nopo)
Average Number/ Year: Non-migrant

Range Map:



Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:

Non-migrant. Resident Population common at all times.

Identification:

Black Vulture (*Coragyps atratus*)



Identification: Smaller than the Turkey Vulture with shorter, wider wings. Overall black with white wing tips. Flaps more frequently than Turkey Vulture. Seen in kettles with other vultures, but rarely in the line of migration.

L: 60-68 cm (24-27 in) **WS:** 137-150 cm (54-59 in)

Year-round Range: Widespread in E. United States and Mexico, Central and South America.

Local Name: Zopilote (Nopo)

Other Information:

Black Vultures are present most of the time at the count sites in Cardel and Chichicaxtle. Generally they are not moving from north to south as are the migrant raptors.

Occasionally, they will mix briefly with groups of Turkey Vultures. They can be separated from non-soaring Turkey Vultures by the fact that they flap their wings more often than the Turkey Vultures.

Raptor Photo: Bill Clark

Raptor Drawing: Julio Gallardo